

Information till dig som fått implantatskruvar inopererat i käkbenet.

Blödning

Det är normalt att såret blöder lätt det första dygnet. Skölj då ej mer än absolut nödvändigt. Ökad blödning stillas med tryckförband (kompress eller ren näsduk) som du skall bit hårt på i c:a 20 minuter sittande. Upprepa vid behov. Ha huvudet så högt som möjligt.

Blåmärke

Detta kan uppstå ibland speciellt vid operationer i underkäken, men försvinner utan åtgärd inom c:a en vecka.

Smärta

Uppstår när bedövningen släpper. Smärtan kan variera i intensitet framförallt första dygnet och kan ibland kvarstå i flera dygn. Använd enbart de rekommenderade smärtlindrande tabletter enligt anvisningarna. Ta inga andra tabl. På eget initiativ. Vid svår smärta kontakta operatören för att erhålla andra receptbelagda värktabletter.

Svullnad

En normal kroppsreaktion på kirurgisk behandling. Kan uppstå i såväl munhåla som i ansikte och kan medföra svårigheter att gapa. När oftast sitt maximum efter 2-4 dagar och försvinner vanligen inom c:a en vecka.

Feber

Kroppstemperaturen kan vara lätt förhöjd inom ett dygn efter operationen. Vid hög temperaturstigning kontakta operatören.

Föda

Under det första dygnet bör födan vara flytande eller mjuk. Undvik varma och sura drycker första dygnet.

Munhygien

Använd tandborste som vanligt i övriga delen av munnen men inte direkt efter sköljningen. Skölj mycket med vatten efter måltiderna. Var försiktig att peta i såret. Ofta bildas en gul/vit plugg. Denna består av kollagen och är en naturlig del av läkningen

Stygnen

Vissa typer av stygn löses upp efter 1-2 veckor, andra måste tas bort hos operatör. Du får info. Om vilken typ du har fått

Kroppsansträngningar

Undvik hård kroppsansträngning och överdriven fysisk aktivitet under första tiden efter operationen och framförallt om det blöder från såret.

Rökning

Rökning ger upphov till sämre läkning av dina implantatskruvar. Prognosen på din implantatbehandling ökar om du helt slutar eller försöker sluta röka. Detta är även något du fått information om innan implantatbehandlingen påbörjats. RÖKNING ÄR EN BELASTNING FÖR ETT LYCKAT RESULTAT.